

中基 9

1. (2022/2021)《黄帝内经》所说阴阳属性的征兆是

- A.寒热
- B.上下
- C.水火
- D.左右
- E.动静

答案：C

解析：《素问阴阳应象大论》：“天地者，万物之上下也；阴阳者，气血之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也。”

2. (2022) 依据事物属性的五行归类，五声中属“金”的是

- A.呼
- B.笑
- C.歌
- D.哭
- E.呻

答案：D

解析：五声对应五行，呼属木，笑属火，歌属土，哭属金，呻属水。

3. (2021) 中医学关于人体“本”的说法，下列哪项是错误的

- A.肝为罢极之本
- B.心为神之本
- C.脾为后天之本
- D.肺为气之本
- E.肾为先天之本

答案：B

解析：心者，生之本，神之变也。

4. (2022) 胆被称为“中精之腑”，又称

- A.将军之官
- B.传导之官
- C.受盛之官
- D.中正之官
- E.水谷之海

答案：D

解析：因胆汁清静，称为“精汁”，故《灵枢·本输》称胆为“中精之腑”，亦有医家将其称为“中清之腑”。胆主决断，胆具有判断事物、作出决定的作用。所以《素问·灵兰秘典论》说：“胆者，中正之官，决断出焉。”

5. (2021) 畏寒肢冷对应的致病特点是

- A.气的推动功能异常
- B.气的温煦功能异常
- C.气的调控功能异常
- D.气的凉润功能异常

E.气的防御功能异常

答案：B

解析：气的温煦作用的生理意义包括①维持机体恒定的体温；②有助于脏腑经络组织器官的功能活动；③血液和津液等液态物质在气的温煦作用下正常运行，发挥正常的生理活动。所以当气的温煦功能异常时，会出现畏寒肢冷。

6. (2021) 足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉，变换前中位置，是在

A.外踝上 8 寸处

B.内踝上 2 寸处

C.内踝上 3 寸处

D.内踝上 5 寸处

E.内踝上 8 寸处

答案：E

解析：足厥阴肝经在内踝尖上八寸处交出足太阴脾经之后，上行过膝内侧。

7. (2022) 六淫致病，最容易引起疼痛的邪气是

A.风邪

B.寒邪

C.湿邪

D.燥邪

E.火邪

答案：B

解析：寒性凝滞，寒邪伤人，阳气受损，失其温煦，易使经脉气血运行不畅，甚或凝结阻滞不通，不通则痛。故寒邪是最易导致疼痛的外邪。

8. (2022) "大怒则形气绝，而血菀于上"的病机

A.血随气逆

B.肺气上逆

C.肝血不足

D.髓海空虚

E.津液亏损

答案：A

解析：怒则气上，大怒致使肝气上逆，气升太过，血随气逆。

9. (2022) 患者本为水不涵木之肝阳上亢，继而出现肢冷面白、脉沉弱，属于

A.阳气亏损

B.真寒假热

C.真热假寒

D.阴损及阳

E.阳盛格阴

答案：D

解析：水不涵木之肝阳上亢，为阴虚；之后出现的肢冷面白、脉沉弱为阳虚。在阴虚的基础上，继而导致阳虚，属于阴损及阳。

中诊 9

1. (2022) 少神的临床表现为

- A. 意识模糊
- B. 焦虑恐惧
- C. 脉微欲绝
- D. 倦怠乏力
- E. 猝然昏倒

答案：D

解析：少神又称为神气不足，是指精气不足，神气不旺的表现。介于得神与失神之间。表现为精神不振，两目乏神，面色少华，肌肉松软，倦怠乏力，少气懒言，动作迟缓等。

2. (2021) 以下选项中不属于病态舌形内容的为

- A. 胖大舌
- B. 肿胀舌
- C. 歪斜舌
- D. 点刺舌
- E. 裂纹舌

答案：C

解析：歪斜舌属于舌态的变化。

3. (2022) 咳声不扬，痰黄难咯者属

- A. 痰湿阻肺
- B. 热邪犯肺
- C. 燥邪犯肺
- D. 肺肾阳虚
- E. 寒邪犯肺

答案：B

解析：咳声不扬，痰稠色黄，不易咳出多属热证，多因热邪犯肺，灼伤肺津所致。

4. (2022) 结脉与代脉的主要区别在于

- A. 节律不同
- B. 至数不同
- C. 脉力不同
- D. 脉位不同
- E. 流利度不同

答案：A

解析：结脉脉来迟而时一止，止无定数；代脉脉来迟而中止，止有定数。故二者主要的区别为节律不同。

5. (2021) 脉象特征为绷急弹指，状如牵绳转索，其临床意义是

- A. 湿证
- B. 瘀血
- C. 痰饮
- D. 肝胆病
- E. 实寒

答案：E

解析：紧脉见于实寒证、疼痛和食积等。

6. (2022) 湿温潮热的特点是

- A. 至夏则热，秋凉则止
- B. 身热不扬，午后热甚
- C. 高热不退，日晡热甚
- D. 入夜发热，天明热退
- E. 长期发热，劳必益甚

答案：B

解析：湿温潮热午后发热明显，其特点是身热不扬，肌肤初扪之不觉很热，扪之稍久即觉灼手，为湿郁热蒸之象。

7. (2022) 下列不属于实证范畴的是

- A. 食积
- B. 内燥
- C. 气滞
- D. 水湿
- E. 瘀血

答案：B

解析：吐泻汗下过甚，或热病久而伤津或久病致精血耗伤均可形成内燥。

8. (2022) 下列各项属心阴虚与心血虚共同表现的是

- A. 心悸失眠
- B. 心烦健忘
- C. 乏力自汗
- D. 潮热盗汗
- E. 脉象细数

答案：A

解析：心血虚与心阴虚均可见心悸、失眠、多梦等症，但血虚以“色白”为特征而无热象，阴虚以“色赤”为特征而有明显热象。

9. (2022☆) 不属于少阴寒化证临床表现的是

- A. 下利清谷
- B. 四肢厥冷
- C. 恶寒发热
- D. 但欲寐
- E. 食入即吐

答案：C

解析：少阴寒化证临床表现为无热恶寒，但欲寐，四肢厥冷，下利清谷，呕不能食，或食入即吐，脉微细甚或欲绝，或见身热反不恶寒，甚则面赤。

中药 9

1. (2021) 属于相使配伍的是

- A. 石膏配知母
- B. 黄芪配茯苓

- C.半夏配生姜
- D.人参配莱菔子
- E.甘草配海藻

答案：B

解析：相使：就是以一种药物为主，另一种药物为辅，两种药物合用，辅药可以提高主药的功效。如黄芪补气利水，茯苓利水健脾，两药配合，茯苓能提高黄芪补气利水的治疗效果。

2. (2022) 在“十八反”中，下列除哪味药物外均与乌头相反

- A.玄参
- B.白及
- C.贝母
- D.瓜蒌
- E.半夏

答案：A

解析：十八反：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头类（含川乌、草乌、附子）反半夏、瓜蒌、天花粉、贝母（含川贝母、浙贝母）、白蔹、白及；藜芦反人参、西洋参、党参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（含赤芍、白芍）。

3. (2022) 下列药物用法不正确的是

- A.龙骨先煎
- B.巴豆榨汁，冷开水调服
- C.鸦胆子装胶囊服用
- D.芦荟入丸剂服用
- E.番泻叶开水泡服

答案：B

解析：巴豆有大毒，宜制霜服用。

4. (2022☆) 羌活、独活都能祛风解表、胜湿止痛，其区别在于

- A.独活为“风药中之燥剂”，羌活则为“风药中之润剂”
- B.羌活的解表力弱，独活的解表力强
- C.羌活能够治疗阳明头痛，独活能够多治疗少阳头痛
- D.独活善于治疗半身以下的寒湿痹痛，羌活善于治疗半身以上的寒湿痹痛
- E.以上都不是

答案：D

解析：羌活与独活二药，均能祛风胜湿、止痛、解表，常用治风寒湿痹和外感风寒湿表证。但羌活气味较浓，发散解表力强，善治上部风寒湿痹痛；独活气味较淡，性较和缓，长于治下部风寒湿痹痛，其解表之力不及羌活。若一身尽痛，则二药常相须为用。

5. (2021) 既治寒凝疼痛，又治脾肾阳虚之五更泄泻的药物是

- A.附子
- B.干姜
- C.肉桂
- D.吴茱萸
- E.小茴香

答案：D

解析：吴茱萸散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。主治：寒凝肝脉疼痛。既散肝之寒邪，又疏肝气之郁滞，为治寒滞肝经诸痛之主药；呕吐吞酸；虚寒泄泻，为治脾肾阳虚，五更泄泻之常用药。

6. (2022) 能泻火解毒敛疮，为治水火烫伤之要药的药物是

- A.大蓟
- B.白茅根
- C.侧柏叶
- D.地榆
- E.槐花

答案：D

解析：地榆：主治烫伤、湿疹、疮疡肿痛。泻火解毒敛疮，为治水火烫伤之要药。

7. (2022) 既能治疗寒痰喘咳，悬饮，又能治疗寒凝痰滞之阴疽肿毒的药物是

- A.川贝母
- B.瓜蒌
- C.白前
- D.芥子
- E.旋覆花

答案：D

解析：芥子主治：寒痰喘咳，悬饮；阴疽流注，肢体麻木，关节肿痛。治寒凝痰滞之阴疽肿毒。

8. (2022) 龙骨、牡蛎的共同功效

- A.利尿通淋
- B.润肠通便
- C.收敛固涩
- D.息风止痉
- E.活血散瘀

答案：CC

解析：牡蛎：潜阳补阴，重镇安神，软坚散结，收敛固涩，制酸止痛；龙骨：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

9. (2022) 既能补脾，又能止泻的药物是

- A.山茱萸
- B.莲子
- C.桑螵蛸
- D.肉豆蔻
- E.五倍子

答案：B

解析：莲子：补脾止泻，止带，益肾固精，养心安神。

方剂 8

1. (2021) 下列各项中不属于和法范畴的是

- A.透达膜原
- B.消食和胃
- C.和解少阳
- D.调和营卫

E.调和肝脾

答案：B

解析：和法是通过和解与调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一种治法。适用于邪犯少阳、肝脾不和、寒热错杂等证。其中主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃等。消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水以及驱虫等方法，使气、血、痰、食、水、虫等渐积形成的有形之邪渐消缓散的一种治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、痞积虫积，以及疮疡肿痛等病症。项“消食和胃”属消法范畴，不属于和法。因此本题答案选B。

2. (2022☆) 大青龙汤的组成中不包括

- A.麻黄
- B.桂枝
- C.石膏
- D.杏仁
- E.细辛

答案：E

解析：大青龙汤的组成包括麻黄、桂枝、炙甘草、杏仁、生姜、大枣、石膏。

3. (2022☆) 心下痛，拒按，按之石硬，或从心下至少腹硬满痛，手不可近；伴见短期烦躁，大便秘结，舌上燥而渴，日晡小有潮热，舌红，苔黄腻或兼水滑，脉沉紧或沉迟有力，治疗首选

- A.大陷胸汤
- B.小陷胸汤
- C.桃核承气汤
- D.猪苓汤
- E.大承气汤

答案：A

解析：大陷胸汤主治水热互结之结胸证。症见心下痛，拒按，按之石硬，或从心下至少腹硬满痛，手不可近；伴见短期烦躁，大便秘结，舌上燥而渴，日晡小有潮热，舌红，苔黄腻或兼水滑，脉沉紧或沉迟有力。

4. (2022) 四逆散的组成药物中不包括

- A.柴胡
- B.陈皮
- C.枳实
- D.芍药
- E.炙甘草

答案：B

解析：四逆散的组成为炙甘草、枳实、柴胡、芍药。

5. (2022) 补中益气汤中，助君药升提的是

- A.柴胡、升麻
- B.芍药、当归
- C.人参、当归
- D.橘皮、白术
- E.柴胡、葛根

答案：A

解析：补中益气汤中升麻、柴胡升举清阳，协黄芪升提下陷之中气，以助升阳举陷之功。

6. (2021) 下列可以体现心肾同治的方剂是

- A. 桑螵蛸散
- B. 百合固金汤
- C. 六味地黄丸
- D. 真人养脏汤
- E. 地黄饮子

答案: A

解析: 桑螵蛸散的功用为调补心肾, 固精止遗, 证由心肾两虚, 水火失济所致。

7. (2022) 羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方均具有的功用是

- A. 清热平肝息风
- B. 滋阴增液舒筋
- C. 清热活血止痛
- D. 滋阴潜阳息风
- E. 滋阴清热安神

答案: A

解析: 羚角钩藤汤的功用是凉肝息风, 增液舒筋。天麻钩藤饮功用是平肝息风, 清热活血, 补益肝肾。二方均可清热平肝息风。

8. (2022) 麦门冬汤中半夏的作用不包括

- A. 降逆以止咳喘
- B. 开胃行津以润肺
- C. 防大量麦冬之滋腻壅滞
- D. 与麦门冬相反相成
- E. 化痰消痞散结

答案: E

解析: 麦门冬汤中半夏降逆下气、化痰和胃。一则降逆以止咳喘, 二则开胃行津以润肺, 三则防大量麦冬之滋腻壅滞, 二药相反相成。

中内 9

(1~3 题共用题干)

患者, 女, 42 岁。全身水肿, 下肢明显, 按之没指, 小便短少, 身体困重, 胸闷, 纳呆, 泛恶, 舌苔白腻, 脉沉缓。

1. 其辨证是

- A. 水湿浸渍证
- B. 风水相搏证
- C. 肾阳衰微证
- D. 脾阳虚衰证
- E. 湿毒浸淫证

答案: A

解析: 患者以全身水肿为主要症状, 诊断为水肿。全身水肿, 下肢明显, 按之没指为水湿之

邪浸渍肌肤，壅滞不行所致；水湿内聚，三焦决渎失司，膀胱气化不利，故小便短少；脾为湿困，阳气不得舒展，故身体困重，胸闷，纳呆，泛恶；舌苔白腻，脉沉缓均为湿胜脾弱之象，故辨证为水湿浸渍证。

2.其治法为

- A. 健脾温阳利水
- B. 活血祛瘀，化气行水
- C. 运脾化湿，通阳利水
- D. 宣肺解毒，利湿消肿
- E. 分利湿热

答案：C

解析：水湿内侵，困阻脾阳，脾失转输，水泛肌肤宜采用运脾化湿，通阳利水的治疗方法。

3.治疗应首选

- A. 五皮饮合胃苓汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 越婢加术汤
- D. 实脾饮
- E. 疏凿饮子

答案：A

解析：水湿浸渍之水肿的首选治疗方药：五皮饮合胃苓汤加减。前方理气化湿利水；后方通阳利水，燥湿运脾。两方合用，共奏运脾化湿、通阳利水之功，主治水湿困遏脾阳，阳气尚未虚损，阳不化湿所致之水肿。

(4~6 题共用题干)

金某，女性，35 岁。一年来，大便时溏时泻，迁延反复，稍进油腻食物，则腹泻，面色萎黄，纳差，食后脘闷不舒，神疲倦怠，舌质淡，苔白，脉细弱。

4.其诊断为

- A. 脾胃虚弱之泄泻
- B. 肝气乘脾之泄泻
- C. 肾阳虚衰之泄泻
- D. 脾气虚弱之痢疾
- E. 寒热错杂之痢疾

答案：A

解析：题中患者以大便时溏时泻，迁延反复，稍进油腻食物，则腹泻为主要症状，故诊断为泄泻。大便时溏时泻为脾胃虚弱，运化无权，水谷不化，清浊不分所致；脾气虚弱，运化失常，故纳差，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则腹泻；久泻不止，脾胃虚弱，气血生化不足，故面色萎黄，神疲倦怠；舌质淡，苔白，脉细弱均为脾胃虚弱之象，故辨证为脾胃虚弱证。

5.此病证的治法是

- A. 温肾健脾，固涩止泻
- B. 健脾益气，渗湿止泻
- C. 温中健脾
- D. 消食导滞，和中止泻
- E. 升提中气

答案：B

解析：脾胃虚弱，运化无权益采用健脾益气，渗湿止泻的治疗方法。

6.其治疗首选的方药为

- A . 少腹逐瘀汤
- B . 补中益气汤
- C . 痛泻要方
- D . 参苓白术散
- E . 四神丸

答案：D

解析：脾胃虚弱之泄泻的治疗首选方药：参苓白术散加减。本方功能健脾益气，渗湿止泻，适用于脾胃气虚夹湿之泄泻。

(7~9 题共用题干)

患者胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，食后胃胀明显，经常呕吐清水痰涎，心悸头晕，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。

7.其诊断是

- A . 痰饮
- B . 悬饮
- C . 溢饮
- D . 支饮
- E . 悬饮

答案：A

解析：痰饮是指体内水液输布、运化失常，停积于某些部位的一类病证，有广义和狭义之分。广义痰饮包括痰饮、悬饮、溢饮、支饮四类，是诸饮的总称。痰饮主要表现为心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声，形体昔肥今瘦，属饮停胃肠。悬饮主要表现为胸胁饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，或有肺癆病史，属饮流胁下。溢饮主要表现为身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，汗当出而不出，或伴咳喘，属饮溢肢体。支饮主要表现为咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，属饮邪支撑胸肺。患者以胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音为主要症状，诊断为痰饮。

8.其辨证为

- A . 脾阳虚弱
- B . 经气不和
- C . 寒饮内伏
- D . 寒饮伏肺
- E . 饮停胸胁

答案：A

解析：胃中停饮，支撑胸胁，故胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音；进食则胃纳增加，故食后胃胀明显；水饮上逆，故经常呕吐清水痰涎；饮凌心肺，故心悸头晕；脾虚不能化为精微充养形体，而致形体逐渐消瘦；舌苔白滑，脉弦细而滑均为脾阳虚之象，故辨证为脾阳虚弱证。

9.其首选治疗方法是

- A . 柴枳半夏汤
- B . 沙参麦冬汤合泻白散
- C . 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- D . 小青龙汤
- E . 金匱肾气丸合苓桂术甘汤

答案：C

解析：脾阳虚弱，清阳不升，水饮停胃宜采用温脾化饮的治疗方法，首选苓桂术甘汤合小半

夏加茯苓汤。前方温脾阳，利水饮，用于胸胁支满，目眩，气短；后方和胃降逆，用于水停心下，脘痞，呕吐，眩悸。

中妇 8

1. (2022) 肾阳虚，命门火衰，胞宫虚寒可导致的妇科疾病是

- A.妊娠腹痛
- B.带下过多
- C.月经过少
- D.月经后期
- E.闭经

答案:A

解析:肾阳虚，命门火衰，冲任失于温煦，下不能暖宫，胞宫虚寒，可致妊娠腹痛、产后腹痛、宫寒不孕。

2. (2022) 患者，女，22岁，未婚。经期延后，量少、色暗、有血块，腹痛喜热，畏寒，舌暗苔白，脉沉紧。其治法是

- A.暖宫止痛调经
- B.理气止痛调经
- C.活血行气调经
- D.扶阳祛寒调经
- E.温经散寒调经

答案:E

解析:主症为经期延后，量少、色暗、有块，伴腹痛拒按，喜热畏寒，辨证为月经后期血寒之实寒证，治宜温经散寒调经。D为重要干扰项，为月经后期血寒之虚寒证治法。

3. (2022) 患者月经量少，色淡红，质黏腻，胸闷呕恶，带多，舌淡苔白腻，脉滑。方选

- A.滋血汤
- B.归肾丸
- C.桃红四物汤
- D.苍附导痰丸
- E.二陈汤

答案:D

解析:月经过少痰湿证。主要证候:经行量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻；舌淡，苔白腻，脉滑。治法:化痰燥湿调经。方药:苍附导痰丸或二陈加芎归汤。

4. (2022) 患者带下量多，黄绿如脓，质黏腻，臭秽难闻，小腹疼痛，腰骶酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.五味消毒饮
- B.内补丸
- C.知柏地黄汤
- D.止带方

E.龙胆泻肝汤

答案:A

解析:热毒蕴结证——主要证候:带下量多,黄绿如脓,或赤白相兼,或五色杂下,质黏腻,臭秽难闻,小腹疼痛,腰骶酸痛,烦热头晕,口苦咽干,小便短赤,大便干结,舌红,苔黄或黄腻,脉滑数。治法:清热解毒。方药:五味消毒饮,

5. (2021) 患者,女,24岁,已婚。妊娠6个半月,面目四肢浮肿,皮薄光亮,按之没指,纳呆便溏,舌胖嫩苔薄腻,脉滑缓无力。治疗应首选

A.白术散

B.真武汤

C.天仙藤散

D.猪苓汤

E.茯苓导水汤

答案:A

解析:患者妊娠6个半月,浮肿遍及全身,皮薄光亮,按之没指,皮薄光亮,并伴有纳呆便溏,舌胖嫩苔薄腻等脾虚之象,故诊断为妊娠子肿脾虚证,治疗要健脾利水,故选择白术散加砂仁。

6. (2022) 患者,女,28岁,已婚。产后恶露过期3个月未止,量时少或时多,色暗有块,小腹疼痛拒按,舌紫暗或边有瘀点,脉沉涩。治疗应首选

A.清热固经汤

B.生化汤加益母草、炒蒲黄

C.清热调血汤

D.清经散

E.牡丹散

答案:B

解析:产后恶露过期3个月未止辨病为产后恶露不绝。量时少或时多,色暗有块,小腹疼痛拒按,舌紫黯或边有瘀点,脉沉涩,辨证为血瘀证。治当活血化瘀止血,方选生化汤加益母草、炒蒲黄。

7. 患者婚久不孕,月经常提前,经量少,行经时间延长,经色较鲜红,形体消瘦,腰膝酸软,五心烦热,失眠多梦,肌肤失润;舌质稍红略干,苔少,脉细或细数。治疗应首选的方剂是

A.左归丸

B.六味地黄丸

C.养精种玉汤

D.育阴汤

E.加减苁蓉菟丝子丸

答案:C

解析:女子婚后未避孕,有正常性生活,同居一年以上,而未受孕者;或曾有过妊娠,而后未避孕,又连续一年以上未再受孕者,称“不孕症”。肾阴虚证主要证候:婚久不孕,月经常提前,经量少或月经停闭,经色较鲜红;或行经时间延长,甚则崩中或漏下不止;形体消瘦,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,失眠多梦,眼花心悸,肌肤失润,阴中干涩;舌质稍红略干,苔少,脉细或细数。治法:滋肾养血,调补冲任。方药:养精种玉汤。

8. (2022) 患者经期或经后头晕头痛,心悸少寐,神疲乏力,舌淡苔薄,脉虚细。其治法是

A.养血益气

B.养阴清热

C.调气活血

D.柔肝息风

E.育阴潜阳

答案:A

解析:经行头痛血虚证。主要证候:经期或经后头晕,头部绵绵作痛,月经量少,色淡,质稀;心悸少寐,神疲乏力;舌淡,苔薄,脉虚细。治法:养血益气。方药:八珍汤加首乌、蔓荆子。

中外 9

(1~3 题共用题干)

8 月上旬,一男性儿童前额部出现 2 个红肿结块,约 2cm×2cm,中央有一个脓头未溃,疼痛拒按,伴口渴便秘,尿短赤。

1.其诊断为

A. 疔

B. 疖病

C. 有头疖

D. 蝼蛄疖

E. 多发性疖

答案: C

解析:有头疖的临床表现:患者皮肤上有一红色结块,范围约 3cm,灼热疼痛,突起根浅,中心有一脓头,出脓即愈。

2.应选用

A. 五味消毒饮

B. 仙方活命饮

C. 清暑汤

D. 防风通圣散

E. 黄连解毒汤

答案: C

解析:结合患儿的症状可辨证为暑热浸淫证。证候:发于夏秋季节,以小儿及产妇多见。局部皮肤红肿结块,灼热疼痛,根脚很浅,范围局限。伴发热,口干,便秘,溲赤。舌苔薄腻,脉滑数。治法:清暑化湿解毒。代表方:清暑汤加减。

3.外治法可选用

A. 太乙膏

B. 九一丹

C. 青黛散

D. 生肌散

E. 三黄洗剂

答案: E

解析:疖的外治法:初起,小者用千锤膏或三黄洗剂外搽,大者用金黄散或玉露散,以银花露或菊花露调成糊状外敷。遍体发疮、破流脓水成片者,用青黛散、麻油调敷。脓成则切开排脓,用九一丹掺太乙膏盖贴。脓尽改用生肌散收口。

(4~6 题共用题干)

患者,女,20 岁,鼻翼右侧有一枚粟粒样脓头,麻痒并作,红肿热痛,顶突根深坚硬,舌红,苔薄黄,脉数。

4.治则应为

- A . 和营托毒
- B . 清热利湿，和营消肿
- C . 散风清热，化痰消肿
- D . 清热解毒
- E . 和营托毒，清热利湿

答案：D

解析：根据患者的临床表现辨为颜面部疔疮初起。疔的内治，以清热解毒为治疗大法。

5.中医辨证为

- A . 暑热浸淫证
- B . 热毒蕴结证
- C . 火毒炽盛证
- D . 火毒入络证
- E . 气血两虚证

答案：B

解析：结合患者的症状可辨证为热毒蕴结证。证候：

6.治疗首选

- A . 五味消毒饮
- B . 牛蒡解肌汤
- C . 柴胡清肝汤
- D . 萆薢渗湿汤
- E . 活血散瘀汤

答案：A

解析：热毒蕴结证的治法为清热解毒。方药：五味消毒饮、黄连解毒汤加减。

7. (2022) 患者女性，24 岁，8 个月前因食用鱼虾后全身起风团，后反复发作，迁延日久，每次发作时原因不明，瘙痒明显，舌淡红，苔白，脉沉细。宜选用何方治疗

- A . 桂枝汤
- B . 四物消风散
- C . 当归饮子加减
- D . 八珍汤
- E . 消风散

答案：C

解析：瘾疹血虚风燥证

证候：反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热；舌红少津，脉沉细。治法：养血祛风，润燥止痒。方药：当归饮子加减。

8. (2021) 治疗肠痈热毒证的代表方剂是

- A . 仙方活命饮加减
- B . 黄连解毒汤合五味消毒饮加减
- C . 大黄牡丹汤加减
- D . 复方大柴胡汤加减
- E . 大黄牡丹汤合透脓散加减

答案：E

解析：肠痈热毒证

证候：腹痛剧烈，全腹压痛、反跳痛、腹皮挛急；高热不退或恶寒发热，时时汗出，烦渴，

恶心呕吐，腹胀，便秘或似痢不爽。舌红绛而干，苔黄厚干燥或黄糙，脉洪数或细数。

治法：通腑排脓，养阴清热。代表方：大黄牡丹汤合透脓散加减。

9. (2022) 四妙勇安汤治疗脱疽适用于

- A. 寒湿阻络证
- B. 血脉瘀阻证
- C. 气血两虚型
- D. 热毒伤阴证
- E. 湿热毒盛证

答案：E

解析：脱疽湿热毒盛证

证候：患肢剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，肉色不鲜；身热口干，便秘溲赤；舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，解毒活血。

代表方：四妙勇安汤加减。

中儿 8

1. (2022) 一般幼儿的用药剂量是成人的

- A. 1/6
- B. 1/3
- C. 1/2
- D. 2/3
- E. 1/4

答案：C

解析：中药的剂量与年龄等因素相关，一般老年人、小儿都要在成年人用药的基础上减量。新生儿用成人量的 1/6，乳婴儿用成人量的 1/3，幼儿用成人量的 1/2，学龄儿童用成人量的 2/3 或接近成人用量。

2. (2022) 患儿，5 岁。证见发热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，微咳，兼见脘腹胀满，呕吐酸腐，口气秽浊，大便酸臭，小便短黄，舌质红，苔厚腻，脉滑。其病证是

- A. 呕吐
- B. 腹痛
- C. 积滞
- D. 伤食泻
- E. 感冒夹滞

答案：E

解析：感冒夹滞证。证候：感冒兼见脘腹胀满，不思饮食，呕吐酸腐，口气秽浊，大便酸臭，或腹痛泄泻，或大便秘结，舌苔厚腻。治法：解表兼以消食导滞。代表方剂：在疏风解表基础上加用保和丸。

共用题干：

患儿，2 岁。脘腹胀满，按之痛甚，嗳腐吞酸，不思乳食，腹泻，呕吐，吐物酸馊，矢气频作，大便秽臭，夜卧不安，时时啼哭，舌红，苔厚腻，指纹紫滞。

3. (2022) 其诊断是

- A. 腹痛，腹部中寒

- B.腹痛，乳食积滞
- C.腹痛，胃肠热结
- D.腹痛，脾胃虚寒
- E.腹痛，气滞血瘀

答案:B

4. (2022) 其治法是

- A.温中散寒，理气止痛
- B.消食导滞，行气止痛
- C.通腑泄热，行气止痛
- D.温中理脾，缓急止痛
- E.活血化瘀，行气止痛

答案:B

5. (2022) 治疗应首选

- A.香砂平胃散
- B.大承气汤
- C.养脏汤
- D.小建中汤
- E.少腹逐瘀汤

答案:A

解析:腹痛-乳食积滞证:脘腹胀满，按之痛甚，嗳腐吞酸，不思乳食，矢气频作或腹痛欲泻，泻后痛减，或有呕吐，吐物酸馊，大便秘臭，夜卧不安，时时啼哭，舌红，苔厚腻，脉沉滑，指纹紫滞。治法:消食导滞，行气止痛。代表方剂:香砂平胃散。

6. (2022) 患儿，男，3岁，因易汗出1个月前来就诊。症见汗出，以头部、肩背明显，活动后加重，神倦乏力，面色少华，肢端欠温，平时易感冒。舌质淡，舌边齿印，苔薄白，脉弱。治疗首选方剂是

- A.参苓白术散
- B.玉屏风散合牡蛎散
- C.生脉散
- D.四君子汤
- E.黄芪桂枝五物汤

答案:B

解析:根据患儿症状可诊断为汗证之肺卫不固证，治法为益气固表，方用玉屏风散合牡蛎散。

7. (2022) 患儿，6岁。发病2周，全身浮肿，尿少，头晕，头痛，恶心呕吐，口中气秽，甚至昏迷，舌苔腻，脉滑数。治疗应首选

- A.羚角钩藤汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.己椒苈黄丸合参附汤
- D.温胆汤合附子泻心汤
- E.真武汤

答案:D

解析:湿浊内盛，脾肾衰竭，三焦壅塞，水湿失运，不得通泄，致使水毒内闭，尿少。辨证属水肿变证之水毒内闭，治法为通腑降浊，解毒利尿，方用温胆汤合附子泻心汤。温胆汤能清胆和胃，燥湿化痰;附子泻心汤附子温经扶阳，三黄清泄邪热，干姜辛开温中，合用可通腑降浊，解毒利尿。羚角钩藤汤、龙胆泻肝汤合用治邪陷心肝之水肿;己椒苈黄丸合参附汤

用治水凌心肺之水肿。真武汤非治疗肾小球肾炎方剂。

8. (2022) 患儿, 3 岁。发热第 4 天, 细小红色疹点自耳后发际起, 发展至面、颈、躯干、四肢, 咳嗽声重, 有如犬吠, 声音嘶哑, 咽喉肿痛, 舌红苔黄腻。治疗应首选

- A. 清咽下痰汤
- B. 清金化痰汤
- C. 竹沥达痰丸
- D. 解肌透痧汤
- E. 化斑解毒汤

答案:A

解析: 患儿发热第 4 天, 细小红色疹点自耳后发际起, 发展至面、颈、躯干、四肢, 当属麻疹, 其以发热恶寒, 咳嗽咽痛, 鼻塞流涕, 泪水汪汪, 畏光羞明, 麻疹黏膜斑, 周身皮肤按序布发麻粒样大小的红色斑丘疹为特征, 麻疹时邪内陷袭肺, 灼津炼液成痰, 痰热壅盛, 肺气失宣, 则见咳嗽, 有如犬吠, 夹痰上攻咽喉, 则见咽喉肿痛, 舌红苔黄腻为邪毒夹痰热上攻之象, 治以清咽下痰汤, 可清热解毒, 利咽消肿。

针灸 9

1. (2022) 经络系统中, 具有约束骨骼、屈伸关节、维持人体正常运动功能的是

- A. 阴阳跷脉
- B. 阴阳维脉
- C. 十二经别
- D. 十二经筋
- E. 奇经八脉

答案: D

解析: 经筋的作用主要是约束骨骼, 利于关节屈伸活动, 以保持人体正常的运动功能。《素问·痿论》曰: "宗筋主束骨而利机关也。"

2. (2021) 被称为"十二经脉之海"的是

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阳跷脉
- E. 阴跷脉

答案: C

解析: 冲脉涵蓄十二经气血, 故称"十二经之海"或"血海"。

3. (2022) 在腕前区, 桡骨茎突与手舟骨之间, 拇长展肌腱尺侧凹陷中的穴位是

- A. 大陵
- B. 太渊
- C. 阳溪
- D. 神门
- E. 阳池

答案: B

解析：太渊在腕前区，桡骨茎突与舟状骨之间，拇长展肌腱尺侧凹陷中。

4. (2022) 在小腿外侧，外踝尖上 8 寸，胫骨前肌外缘的穴位是

- A. 丰隆
- B. 地机
- C. 解溪
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

答案：A

解析：丰隆穴在小腿外侧，外踝尖上 8 寸，胫骨前肌的外缘。

5. (2022) 直立垂手，掌心贴于大腿时，中指尖所指凹陷中，髂胫束后缘，其穴位是

- A. 伏兔
- B. 风市
- C. 梁丘
- D. 髀关
- E. 承扶

答案：B

解析：风市在股部，直立垂手，掌心贴于大腿时，中指尖所指凹陷中，髂胫束后缘。

6. (2021) 留罐法的留置时间一般为

- A. 3~5 分钟
- B. 5~15 分钟
- C. 15~25 分钟
- D. 20~30 分钟
- E. 30~40 分钟

答案：B

解析：留罐的时间视拔罐后皮肤的反应与患者的体质而定，一般为 5-15 分钟。

7. (2021) 患者，女，32 岁。连续 3 个月，经周期提前 10 天左右，经量多，色淡质稀，神疲肢倦，心悸气短，舌淡，脉细弱。针灸治在关元、三阴交、血海的基础上，应加取

- A. 足三里、脾俞
- B. 内关、太冲
- C. 肝俞、肾俞
- D. 归来、子宫
- E. 归来、命门

答案：A

解析：根据题干症状诊断为月经先期之气虚证。经先期针灸治疗主穴为关元、三阴交、血海。气虚配足三里、脾俞。

8. (2022) 治疗瘾疹时，可体现“治风先治血”思想的穴位合用是

- A. 曲池、风门
- B. 三阴交、合谷
- C. 膈俞、血海、委中
- D. 肝俞、心俞、三阴交
- E. 委中、足三里

答案：C

解析：瘾疹的治疗主穴是曲池、合谷、血海、膈俞、委中、三阴交。其中，膈俞、血海、委中合用意在“治风先治血，血行风自灭”，起到疏风、活血、止痒的作用。

9. (2022) 患者左眼灼热，痒痛皆作，眵多黄黏，伴头痛，鼻塞，舌淡苔薄微黄，脉浮数。治疗除局部腧穴外，应选择的主要经穴是

- A.足厥阴、手阳明经穴
- B.足厥阴、足少阴经穴
- C.足太阳、足阳明经穴
- D.手太阴、足阳明经穴
- E.手少阴、手阳明经穴

答案：A

解析：目赤肿痛治以疏风散热，消肿止痛。以局部腧穴及手阳明、足厥阴经穴为主。

诊断 7

1. (2022) 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A.坏死物质吸收
- B.内分泌与代谢障碍
- C.产热过多
- D.散热过少
- E.抗原-抗体反应

答案：B

解析：内分泌与代谢障碍引起的非感染性发热，如甲亢重度脱水等。

2. (2022) 胸痛沿一侧肋间神经分布，考虑是

- A.带状疱疹
- B.非化脓性肋软骨炎
- C.胸膜炎
- D.管肿瘤
- E.心绞痛

答案：A

解析：胸痛沿一侧肋间神经分布，是带状疱疹。

3. (2021) 因解剖位置较深，不能在体表进行检查的是

- A.额窦
- B.筛窦
- C.上颌窦
- D.蝶窦
- E.瞳孔

答案：D

解析：额窦、筛窦、上颌窦、蝶窦统称为鼻窦。鼻窦区压痛多为鼻窦炎，同时伴有鼻塞、流涕和头痛。蝶窦因解剖位置较深，不能在体表进行检查。

4. (2022) 神志不清病人，呼吸深大，可闻及烂苹果气味，应考虑

- A.急性酒精中毒
- B.肝性脑病
- C.尿毒症

- D.有机磷中毒
E.糖尿病酮症酸中毒

答案：E

解析：患者呼吸深大，考虑库斯莫尔呼吸，闻及烂苹果气味，且昏迷，为糖尿病酮症酸中毒昏迷的可能性最大。

5. (2022) 下列各项，不属红细胞增多的疾病是

- A.严重腹泻
B.大面积烧伤
C.肺源性心脏病
D.再生障碍性贫血
E.真性红细胞增多症

答案：D

解析：红细胞相对性增多:因血浆容量减少，血液浓缩所致。见于严重腹泻、频繁呕吐、大量出汗、大面积烧伤、糖尿病酮症酸中毒、尿崩症等。绝对性增多:①继发性:组织缺氧所致，生理性见于新生儿及高原生活者；病理性见于严重的慢性心、肺疾病，如阻塞性肺气肿疾病、肺源性心脏病、发绀型先天性心脏病等。②原发性:见于真性红细胞增多症。再障应该是红细胞减少。

6. (2021) 淋巴细胞增多见于

- A.支气管哮喘
B.急性大出血
C.寄生虫病
D.化脓性感染
E.病毒性肝炎

答案：E

解析：淋巴细胞增多:①感染性疾病:主要为病毒感染，如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、流行性出血热等；某些杆菌感染，如结核病、百日咳、布鲁菌病等。②某些血液病:急性和慢性淋巴细胞白血病、淋巴瘤等。③急性传染病的恢复期。生障碍性贫血和粒细胞缺乏症时，由于中性粒细胞减少，淋巴细胞比例相对增高，但绝对值并不增高。

7. (2022) 患者，女，45岁，发作性右上腹痛3年，加重1天，入院B超显示胆囊内见数个强光斑光团，光团光斑伴声影，强光团光斑可随体位改变方向移动，应

首先考虑的诊断是

- A.肝硬化
B.慢性胆囊炎
C.胆囊结石
D.胆囊癌
E.胰腺癌

答案：C

解析：胆囊结石特征如下:①胆囊内见一个或数个强光团、光斑，其后方伴声影或彗星尾。②强光团或光斑可随体位改变而依重力方向移动。但当结石嵌顿在胆囊颈部，或结石炎性粘连在胆囊壁中(壁间结石)时，看不到光团或光斑随体位改变。不典型者如充填型胆结石，胆囊内充满大小不等的结石，声像图上看不见胆囊回声，胆囊区见一条强回声弧形光带，后方伴直线形宽大声影。

内科 9

1. (2021) 不属于休克诊断要点的是

- A. 出现意识障碍
- B. 黏膜发绀，皮肤呈花斑样
- C. 收缩压 $<80\text{mmHg}$
- D. 脉压差 $>20\text{mmHg}$
- E. 脉搏不能触及

答案：D

解析：脉压差 $<20\text{mmHg}$ 是休克的诊断要点。

2. (2021) 上消化道出血时，一旦出现呕血，提示胃内贮积的血量在

- A. 5-20mL
- B. 50-70mL
- C. 250-300mL
- D. 500-800mL
- E. 800-1000mL

答案：C

解析：①成人每天消化道出血量达 5-10mL，粪便隐血试验阳性；②每天出血量 $>50\text{mL}$ ，出现黑便；③胃内积血量达 250-300mL，可引起呕血；④一次性出血量 $>400\text{mL}$ ，可引起全身症状如烦躁、心悸、头晕、出汗等；⑤数小时内出血量 $>1000\text{mL}$ （循环血容量 20%），可出现周围循环衰竭表现；⑥数小时内出血量 $>1500\text{mL}$ （循环血容量 30%），发生失代偿性休克。

3. (2022) 有机磷农药中毒时，禁用 2%碳酸氢钠洗胃的是

- A. 对硫磷
- B. 乐果
- C. 敌敌畏
- D. 敌百虫
- E. 内吸磷

答案：D

解析：敌百虫中毒禁用 2%碳酸氢钠洗胃。因碱性溶液能使敌百虫转变成毒性更强的敌敌畏。

4. (2022) 支气管哮喘的诊断标准不包括

- A. 反复发作喘息
- B. 残气量增加
- C. 症状可缓解
- D. 支气管舒张试验呈阳性
- E. 发作时闻及以呼气相为主的哮鸣音

答案：B

解析：支气管哮喘的诊断标准为——①反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽，多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关；②发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音，呼气相延长；③上述症状可经治疗缓解或自行缓解；④除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。⑤临床表现不典型者（如无明显喘息或体征）应有下列 3 项中至少 1 项阳性：支气管激发试验阳性、支气管舒张试验阳性、昼

夜 PEF 变异率 $\geq 20\%$ 。

5. (2022) 关于类风湿关节炎疼痛的特点, 错误的是

- A. 关节间游走性疼痛
- B. 为最早出现的表现
- C. 腕、掌指关节最常见
- D. 持续性但时轻时重
- E. 双侧对称性

答案: 解析: 大关节游走性、对称性红、肿、热、痛, 是风湿性关节炎的典型特征。

6. (2022) 诊断尿路感染最有意义的改变是

- A. 畏寒、发热、白细胞增高
- B. 尿中大量红细胞
- C. 尿中白细胞 > 5 个/HP
- D. 尿培养菌落计数 $\geq 10^5$ /mL
- E. 肾区叩击痛

答案: D

解析: 怀疑尿路感染时, 取清洁中段尿, 必要时导尿或膀胱穿刺取标本, 进行培养及药敏试验。如细菌定量培养菌落计数 $\geq 10^5$ /mL, 可确诊; 如菌落计数为 10^4 - 10^5 /mL, 结果可疑; 如 $< 10^4$ /mL, 多为污染。

7. (2022) 癫痫大发作的表现是

- A. 短暂意识丧失, 昏睡
- B. 意识丧失, 全身对称性抽搐
- C. 单侧肢体抽动
- D. 躁动、乱语
- E. 发作性四肢抽搐

答案: B

解析: 全面性强直-阵挛发作, 即癫痫大发作, 以意识丧失和全身对称性抽搐为特征。分为 3 期, 强直期、阵挛期、痉挛后期。

8. 溃疡性结肠炎最主要的症状是

- A. 黏液血便
- B. 腹痛
- C. 腹泻
- D. 腹肌紧张、反跳痛
- E. 里急后重

答案: C

解析: 腹泻为溃疡性结肠炎最主要的症状, 常反复发作或持续不愈, 轻者每天排便 2-4 次, 便血轻或无。

9. (2022) 对起病 3-6 小时 ST 段抬高性急性心梗最具意义的治疗措施

- A. 解除疼痛
- B. 消除心律失常
- C. 控制休克
- D. 治疗心衰
- E. 再灌注治疗

答案: E

解析: 急性心肌梗死的再灌注治疗在起病 3-6 小时最迟在 12 小时内, 使闭塞的冠状动脉再

通，心肌得到再灌注，濒死的心肌得以存活或使坏死范围缩小，减轻梗死后心肌重塑，改善预后，是一种积极的治疗措施。

四大经典 8

1. (2022☆) 伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利。舌苔厚腻。选方最宜

- A.小柴胡汤
- B.半夏泻心汤
- C.甘草泻心汤
- D.旋复代赭汤
- E.生姜泻心汤

答案：E

解析：此证病机为胃虚不化，水气致痞。治以生姜泻心汤列以散水止利，和胃消痞。这里需要注意寒热错杂三泻心汤证的证治异同：三泻心汤证均以心下痞，呕逆，下利，肠鸣为主症，其病机均有中虚寒热错杂，胃气壅滞，其治疗均用辛开苦降，甘温益气之法，选药以半夏泻心汤为基础方。不同：半夏泻心汤证主症呕逆更明显，病机重心在升降失常，故治疗重在和胃降逆，以半夏为君药；生姜泻心汤证主症有干噫食臭，其病机兼有水食停滞，治疗兼以和胃散水，在半夏泻心汤基础上加生姜四两为君，减干姜为一两，重在宣散水气，和胃降逆；甘草泻心汤证主症为痞利俱甚，干呕心烦不安症状明显，病机以胃气重虚为主，中气不足尤为明显，治疗重在益胃缓中，故在半夏泻心汤的基础上增炙甘草为四两为君，加强补虚和中。

2. (2022☆) 炙甘草汤证的脉症见

- A.心下悸，头眩，身瞤动
- B.伤寒脉结代，心动悸
- C.伤寒脉浮，自汗出，小便数
- D.发汗，病不解，反恶寒者
- E.太阳病发汗，汗出不解

答案：B

解析：炙甘草汤证为心阴阳两虚，见心动悸，少气乏力，头晕，面色少华，舌质淡红或嫩红，脉结代。

3. (2022☆) "寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状"选方最宜

- A.麻黄加术汤
- B.麻杏苡甘汤
- C.桂枝附子汤
- D.黄芪桂枝五物汤
- E.桂枝芍药知母汤

答案：D

解析：本条论述了血痹的证治。血痹是由于素体气血不足，血行涩滞致使身体肌肤失于濡养，而出现身体麻木不仁，甚则或有疼痛，类似风痹的症状。"寸口关上微，尺中小紧"提示了阳气不足，阴血涩滞之象。方用黄芪桂枝五物汤以益气通经，和营行痹。

4. (2022☆) 患者症见梦遗、滑精频作，梦交，少腹挛急，外阴寒冷，目眩、头发脱落，脉极虚芤迟，治疗首选

- A.桂枝芍药知母汤
- B.小建中汤
- C.桂枝龙骨牡蛎汤
- D.酸枣仁汤
- E.天王补心丹

答案：C

解析：长期遗精，阴精损耗难复，头面失于濡养，故目眩、头发脱落；日久阴损及阳，虚寒内生，故少腹弦急、前阴寒冷。此外，“脉极虚芤迟”“脉芤动微紧”均为阴阳两虚之脉，可见于男子遗精、女子梦交。方用桂枝汤调和阴阳，加龙骨、牡蛎潜镇固涩。

5. (2022☆) 叶天士提出的“救阴通阳”指

- A.救阴不在津，而在血与汗；通阳不在温，而在利小便
- B.救阴不在津，而在血与汗；通阳当用温，不在利小便
- C.救阴不在血，而在津与汗；通阳当用温，不在利小便
- D.救阴不在血，而在津与汗；通阳当用温，亦在利小便
- E.救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便

答案：E

解析：“救阴不在血，而在津与汗，通阳不在温，而在利小便。”治疗温病时“救阴”“通阳”的目的与治疗杂病时不同。温病治疗中救阴的目的不在于滋养阴血，而在于顾护津液，防止过汗伤津；而通阳的目的不在于以温药温补阳气，而在于宣通气机，化气利湿通小便，使湿邪随小便而出。

6. (2021☆) 三仁汤中的“三仁”指的是

- A.杏仁、桃仁、薏仁
- B.桃仁、薏仁、蔻仁
- C.薏仁、蔻仁、杏仁
- D.桃仁、蔻仁、杏仁
- E.以上都不是

答案：C

解析：三仁汤中的“三仁”指薏仁、蔻仁、杏仁。

7. (2022☆) 《素问·阴阳应象大论》说：“壮火之气衰，少火之气壮”，其中“壮火”、“少火”的本义是

- A.药食气味纯阳与温和之别
- B.人体阳气亢盛与平和之别
- C.病理之火与生理之火的区别
- D.邪火与正气之别
- E.相火与君火之别

答案：A

解析：“壮火”“少火”，本指药食气味的阴阳性能而言，药食气味纯阳者为壮火，药食气味温和者为少火。

8. (2022☆) 据《素问·阴阳应象大论》，病邪部位高的治法是

- A.散而泻之
- B.引而竭之
- C.因而越之
- D.按而收之
- E.汗而发之

答案：C

解析：《素问阴阳应象大论》曰："其高者，因而越之"指病邪在上焦，宜用涌吐之法使邪从上出。高者，谓病邪在上焦。越之，此指涌吐法。

